

## Sirds pase

### Endokardīta profilakses karte

Pacients (vārds, uzvārds) \_\_\_\_\_

Dzimšanas datums \_\_\_\_\_

Diagnoze, kuras dēļ nepieciešama endokardīta profilakse \_\_\_\_\_

Izsniedzis ārsts: \_\_\_\_\_

Datums: - - / - - / - - - - -

Lietošana	Lietošana bērniem orāli	Nespēj uzņemt orāli
	Lietot 30-60 minūtes pirms manipulācijas	Lietot i/v 30-60 min.pirms manipulācijas
I Pacientam nav alerģijas	p.o.Amoksicilīns 50mg/kg (maks.2g)	i/v Ampicilīns 50mg/kg (maks.2g) i/v Amoksicilīns 50mg/kg (maks.2g)
II Pacientam alerģija pret penicilīnu vai ampicilīnu	p.o.Cefadroksils 25mg/kg (maks. 1g.) <sup>1</sup> p.o. Azitromicīns vai Klaritromicīns 15mg/kg (maks. 500mg) <sup>1</sup>	i/v Cefazolīns 50mg/kg (maks.1 g)

**P.S. Neskaidra drudža gadījumā pirms antibakteriālas terapijas uzsākšanas jāņem asins kultūra!!!**

Diagnosticētu bakteriālu infekciju (pneimonija, tonsillīts, otīts, pielonefrīts u.c.) gadījumā antibakteriāla terapija saskaņā ar vadlīnijām

Neskaidrību gadījumā ārstam konsultēties ar infektologu/antibakteriālās rezistences speciālistu!

<sup>1</sup>Pieaugušiem pacientiem ar alerģiju pret Penicilīnu un Ampicilīnu alternatīva profilakse ir Doxycyclin 200mgx1 p.o.