



## Rīcības plāns anafilakses gadījumā

Bērna vārds, uzvārds

Personas kods

Simptomi	Adrenalīns (EpiPen)	Antihistamīns
Tikko lietots produkts, simptomu vēl nav.	–	+
<b>Mutes dobums:</b> nieze, kņudināšana, lūpu vai mēles pietūkums.	–	+
<b>Āda:</b> nieze, niezoši izsitumi.	–	+
<b>Āda:</b> sejas un/vai ekstremitāšu (pēdu, plaukstu) pietūkums.	+	+
<b>Rīkle:</b> sausums, pietūkuma sajūta, reļošs klepus.	+	+
<b>Vēders:</b> slikta dūša, sāpes vēderā, vemšana, caureja.	–	+
<b>Elpceļi:</b> īsa, ātra elpošana, klepus, spiedoša sajūta krūtīs, sēkšana.	+	–
<b>Apziņa:</b> neskaidra redze, ģībšana.	+	–
<b>Sirds:</b> ātrs pulss, zems asinsspiediens, bāla, zilgana āda, lūpas.	+	–
<b>Ja reakcija progresē</b> (iesaistītas vairākas orgānu sistēmas).	+	+

Adrenalīna autoinjektors: "EpiPen"

Antihistamīns: